



Merkblatt

Impetigo Contagiosa (Grindflechte, Borkenflechte)

Impetigo Contagiosa ist eine hochansteckende Hauterkrankung, welche mit einer Entzündung und Juckreiz einhergeht und häufig im Kindesalter auftritt.

Erreger und Ansteckung Die Ursache dieser Hauterkrankung ist das Bakterium *Staphylococcus aureus* oder *Streptococcus pyogenes*. Eine Ansteckung erfolgt entweder mittels direkten Hautkontaktes oder über Gegenstände (Kleidung, Spielzeuge, Käämme, Handtücher etc., Schmierinfektion). Kratzen und Wunden begünstigen die Ansteckung. Die Inkubationszeit beträgt 2 bis 10 Tage.

Krankheitsanzeichen und Verlauf Charakteristischerweise beginnt die Erkrankung im Mund-Nasen-Bereich und bei den Händen und breitet sich über den restlichen Körper aus. Auf der geröteten Haut bilden sich zuerst klare Bläschen, welche später aufplatzen. Danach entwickelt sich eine honiggelbe Kruste (kleinblasige Form). Bei der grossblasigen Impetigo Contagiosa sind zahlreiche Bläschen vorhanden. Sie sind zuerst wasserklar, später weisslich grau und schliesslich rahmig eitrig. Bei dieser Form bilden sich grosse gerötete glänzende Flächen. In der Regel hat die betroffene Person kein Fieber.

Diagnose und Behandlung Die Behandlung erfolgt mittels antibiotischer Salben und desinfizierender Lösungen bzw. Bädern.

Vorbeugung und Massnahmen Fingernägel sollen möglichst kurz geschnitten und das Kratzen vermieden werden. Die Gegenstände, mit welchen die infizierte Person in Kontakt gekommen ist sollen desinfiziert und Wäsche bei über 60°C gewaschen werden. Regelmässiges Händewaschen. Kein Schwimmen bis zum Abheilen der Hautläsion.

KITA/ Schul-Besuch Eine Borkenflechte führt nicht zu einem Ausschluss aus der KITA/ Schule. Das Kind darf die KITA/ Schule besuchen, wenn dies sein Zustand zulässt.

Kontaktpersonen: Die vorgeschlagenen Punkte unter Vorbeugung und Massnahmen reichen so weit aus. In dieser Situation sind keine weiteren spezifischen Präventionsmassnahmen für Kontaktpersonen empfohlen.